




Presión agrosilvopastoril

Indicadores

Cambios en la modalidad ganadera Densidad regional de cabezas

Descripción del indicador

La ganadería constituye una de las actividades productivas más importantes de la región del Delta. Tradicionalmente se hacía de un modo extensivo, con baja carga y estacional, localizada principalmente en el sector entrerriano. Los animales pastaban libremente durante la época de aguas bajas. En la actualidad se realiza con modalidades de mayor intensidad y con presencia del ganado durante todo el año. El cambio de modalidad ha sido acompañado por un incremento en la densidad de ganado (cabezas/Ha) en diferentes zonas.

Fuentes de datos y procesamiento

Se utilizaron como base los polígonos del trabajo de Quintana et al. 2014, que divide al Delta en 10 regiones ganaderas. Se interpretaron y clasificaron los tipos de cambios en el uso ganadero descriptos en dicho trabajo para cada región. Se estimó la densidad de ganado por unidad regional en función de los datos del total de animales (Tabla 4 del mencionado trabajo) y la superficie de la unidad (Tabla 1 op. cit.). Dichos valores se incorporaron como atributos en la tabla de polígonos de las regiones ganaderas.



Foto: Marcelo Romano

Referencias

Quintana, R. Bó, R. Astrada, E. y Reeves, C. 2014. Lineamientos para una ganadería ambientalmente sustentable en el Delta del Paraná. Fundación Humedales / Wetlands International LAC, Buenos Aires.

Autoría de los datos: Quintana, R. Astrada, E. y Fabricante, I.

Diseño cartográfico: Minotti, P.

Como citar: Quintana, R. Astrada, E. y Fabricante, I. 2014. Cambios en la modalidad ganadera y densidad regional de cabezas. En: Kandus, P. y Minotti, P. Indicadores Georreferenciados de Sustentabilidad Ambiental (ISAg) en humedales, en el Delta del Paraná. Edición 2014.
<http://www.unsam.edu.ar/humedales/>



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN

3iA

INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA AMBIENTAL